



ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ имени В.Р. БОЯНОВОЙ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

*Прививка от гриппа защитит
вашего будущего ребенка*

**ВНИМАНИЮ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН!**

Наступает осенне-зимний период.
Не ждите эпидемического
подъема заболеваемости
гриппом.

Привейтесь!



ВАКЦИНАЦИЯ против гриппа дает возможность не заразиться гриппом будущей маме, ее ребенку и позволяет сформировать «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ», необходимый при встрече С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.

РЕШЕНИЕ О ВАКЦИНАЦИИ беременных и кормящих грудью принимает **ВРАЧ** индивидуально с учетом риска заражения гриппом и возможных осложнений гриппозной инфекции.

В ДЕНЬ ПРИВИВКИ вы должны быть осмотрены **врачом (фельдшером)** с обязательной **термометрией**.

При температуре **выше 37°C** вакцинацию не проводят.

В течение 30 мин. после иммунизации беременная должна находиться под медицинским наблюдением **медсестры или фельдшера**.



К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИН:

1. **Аллергические реакции** на куриные белки и компоненты вакцины.
2. **Острые лихорадочные состояния** или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии).



1-й триместр



2-й триместр



3-й триместр



Наиболее **БЕЗОПАСНА** вакцинация **во втором и третьем триместре**. Вакцинация традиционно **не проводится в течение первого триместра**.

ВАКЦИНЫ ВЫЗЫВАЮТ ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ГРИППА.

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает **через 8–12 дней** и сохраняется **до 12 месяцев**.

Помните, что грипп не так уж и безобиден, как кажется на первый взгляд. Поэтому важно не заниматься самолечением! Выполняйте все назначения врача. Тогда заболевание пройдет без осложнений.